



Endo-ERN



ИНСТРУКЦИИ ЗА ЛЕКАРЯ В БОЛНИЦАТА

Ако детето е доведено в болницата по спешност, съветваме да се спази следният алгоритъм:

- Осигурете венозен път;
- Вземете кръв за урея, електролити, глюкоза и каквото друго сметнете за удачно според случая (например урокултура);
- Проверете кръвната глюкоза с експресен метод (глюкомер);
- Направете 0.25мг/кг тел. тегло метилпреднизолон венозно като болус (това не е необходимо ако пациентът вече е направил метилпреднизолон мускулно!);
- Започнете интравенозни вливания на 0,45% физиологичен серум и/или серум глюкозе в адекватна дозировка (по-висока при дехидратация);
- Добавете калий в зависимост от нивото на електролитите;
- Започнете и.в. инфузия на хидрокортизон (метилпреднизолон) или фракционирано и.в. приложение – на 6 ч., в обща доза 1 мг/кг/24 ч.;
- **Важно!** Ако кръвната глюкоза е под 2.5 ммол/л, направете болус от 10% глюкоза в доза **2 мл/кг**.
- Ако детето е отпуснато, хипотонично и със слабо периферно кръвообръщение, въведете като болус физиологичен серум в доза 20 мл/кг.