



Endo-ERN



КАРТА НА ПАЦИЕНТА

КАКВО ДА ПРАВИТЕ, АКО ДЕТЕТО НЕ СЕ ЧУВСТВА ДОБРЕ

/адренална криза/

1. При наличие на леко или средно по тежест заболяване като настинка, кашлица, възпалено гърло, грип, стомашно неразположение, увеличете двойно общата дневна доза на хидрокортизона и дайте тази удвоена доза, разпределена в поне три еквивалентни приема /сутрин, обед и вечер/ за времето, през което протича заболяването. Пример: хидрокортизон в доза 15 мг се удвоява на 30 мг и се дават 10 мг три пъти дневно. Дозировката на кортинеф не се променя.
2. Хидрокортизонът през устата се заменя с мускулни инжекции хидрокортизон (метилпреднизолон), ако детето:
 - Не се чувства по-добре след удвояване на дозата на таблетките;
 - Чувства се отпаднало;
 - Не е в състояние да приема таблетките през устата /например при продължително повръщане/.
3. От животоспасяващо значение е да имате под ръка ампули хидрокортизон (метилпреднизолон). Моля, проверявайте за срока им на годност!
4. Дозата на инжекционния метилпреднизолон е 1 мг на килограм телесна маса за 24 часа, разделен в 3 приема мускулно (до 4-6 приема, ако се дава венозно).
5. След като сте поставили инжекцията, заведете детето в болницата. Моля, вземете тази листовка със себе си и я покажете на лекаря.